



**NAXXID® Suspension**

Medizinprodukt **CE**0426

- Reduziert den gastroösophagealen Reflux**
- Mildert die Übersäuerung des Magens (Sodbrennen)**
- Schützt die Magenschleimhaut**

#### **1. Erscheinungsbild, Zusammensetzung und Wirkung**

**NAXXID® Suspension** wirkt dem gastroösophagealen Reflux, Sodbrennen und dem damit verbundenen Völlegefühl entgegen.

**NAXXID® Suspension** reduziert die Übersäuerung des Magens und beugt Sodbrennen, Magenschmerzen und den damit verbundenen Verdauungsstörungen vor.

**NAXXID® Suspension** ist unabhängig von der Grunderkrankung wirksam und kann bei Gastritis auch unterstützend angewendet werden.

##### **1.1 Wirkmechanismus**

**NAXXID® Suspension** enthält eine Mischung verschiedener synergistischer Substanzen, die im gastrischen Milieu gemeinsam wirken.

Alginat ist ein Polysaccharid, das aus bestimmten Algen gewonnen wird. Gelangt dieser Faserstoff in das saure Milieu des Magens, bewirkt er sehr schnell die Entstehung eines zähflüssigen, leichten Gels, welches die Magenschleimhaut bedeckt und schützt. Diese spezielle Formulierung aus Natriumalginat und Bikarbonat sorgt für eine schnellere Wirkung.

Zudem erschwert das zähflüssige Alginat-Gel, aufsteigende Bewegungen des Magens und senkt somit die Anzahl der Refluxepisoden. Die Mischung aus Karbonat und Bikarbonat neutralisiert die Magensäure. Darüber hinaus werden die bei der Reaktion entstehenden Kohlendioxid-Bläschen vom Alginatgel aufgefangen, welches in einen Schaum verwandelt wird; dieser Schaum schwimmt auf der Oberfläche der Magensäfte.

##### **1.2 Inhaltsstoffe**

Natriumalginat, Kalziumkarbonat, Kaliumbikarbonat.

**Hilfsstoffe:** Ingwerextrakt (Geschmacksstoff), Ingweröl (Geschmacksstoff), Anis- und Milchgeschmacksstoffe, Wasser, Carborer, Natrium Methylparahydroxybenzoat, Sucralose.

#### **2. Verpackung**

Eine Packung enthält 20 Beutel.

#### **3. Dosierung und Art der Anwendung**

Erwachsene und Jugendliche (12-18 Jahre):

Es wird empfohlen, täglich je einen Beutel nach den zwei Hauptmahlzeiten und vor dem Schlafengehen mindestens zwei Wochen lang bis zum Abklingen der Beschwerden einzunehmen. Bei anhaltenden Beschwerden nach einmonatiger Verwendung von **NAXXID® Suspension** wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Die oben genannte Dosierung ist bei der Bekämpfung der Übersäuerung des Magens und Vorbeugung des gastroösophagealen Reflux wirksam. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung von 3 Beuteln täglich.

#### **4. Nebenwirkungen**

Bei den zur Erreichung der therapeutischen Wirkung notwendigen Dosierungen wurden lediglich Verstopfung bzw. vorübergehende Übelkeit berichtet. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

#### **5. Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln**

Für die Inhaltsstoffe von **NAXXID® Suspension** sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln bekannt.

Als allgemeine Regel sollen jedoch alle oral einzunehmenden Medikamente mindestens zwei Stunden vor oder nach der Anwendung von **NAXXID® Suspension** eingenommen werden.

##### **5.1 Wechselwirkungen mit Arzneimitteln**

Aufgrund seiner zähflüssigen Konsistenz kann das Medizinprodukt die Aufnahme gleichzeitig verabreichter Arzneimittel verzögern oder vermindern. Sprechen Sie daher mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Anwendung von **NAXXID® Suspension** beginnen, besonders wenn Sie die Anti-Baby-Pille verwenden.

Es gibt keine Gegenanzeigen für die Verwendung von **NAXXID® Suspension** mit pharmakologisch wirksamen Arzneistoffen wie Omeprazol, Cimetidin oder Cisaprid; dennoch sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, wenn Sie solche Arzneistoffe gemeinsam mit **NAXXID® Suspension** verwenden.

#### **6. Lagerungsbedingungen**

**NAXXID® Suspension** trocken bzw. fern von Hitze- oder Lichtquellen aufbewahren. **NAXXID® Suspension** nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Zwischen 15°C und 25°C lagern.

##### **7. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei Kindern unter 12 Jahren nicht verwenden.

Bei Jugendlichen (12-18 Jahre) verwenden Sie **NAXXID® Suspension** unter ärztlicher Aufsicht und nur dann, wenn unbedingt notwendig.

**Im Falle einer Schwangerschaft oder beim Stillen verwenden Sie NAXXID® Suspension nur nach ärztlicher Anordnung.**

Die empfohlene Dosis nicht überschreiten, denn höhere Dosierungen können zur Verstopfung oder zu vorübergehendem Durchfall führen.

Bei chronischer Verstopfung oder chronischem Durchfall, Nierenerkrankung oder chronischer Herzinsuffizienz darf **NAXXID® Suspension** nicht verwendet werden.

Wird **NAXXID® Suspension** länger als 30 Tage angewendet, sollte eine Pause von mindestens 7 Tagen eingelegt werden.

Bewirkt **NAXXID® Suspension** auch nach längerer Anwendung keine deutliche Linderung der Beschwerden, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Jeder Beutel ist zur einmaligen Verwendung vorgesehen und sollte erst unmittelbar vor der Einnahme geöffnet werden.

Im Falle einer Unverträglichkeit sollten Sie **NAXXID® Suspension** nicht anwenden.

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe soll **NAXXID® Suspension** ebenfalls nicht angewendet werden.

#### **8. Ablaufdatum**

Verwenden Sie **NAXXID® Suspension** nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das in der intakten Verpackung enthaltene Produkt.

#### **9. Entsorgung**

Das abgelaufene Produkt ist entsprechend den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Werfen Sie das Produkt oder seine Verpackung nicht einfach weg.

**Vertrieb:** ERWO Pharma GmbH,

Europaring F08/101,  
2345 Brunn am Gebirge

**NAXXID®** and **CEUTICS®** sind eingetragene Schutzmarken von The Ceutics Company GesmbH, Wien

**Weitere Informationen finden Sie unter:**

[www.naxxid.com](http://www.naxxid.com)

